

Curavit

Erikoisrehu vasikoille ruuansulatuksen ja vesi-elektrolyyttitasapainon tasapainottamiseen.

Tuoteominaisuudet

- helposti sulavia hiilihydraatteja
- elektrolyyttejä
- monipuolinen kuitukoostumus

Tuote-edut

- vesi-elektrolyyttiaineenvaihdunnan tasapainottaminen
- kuivumisen esto
- nopeasti hyväksikäytettävää energiaa
- ripulin ja taudin etenemisen esto
- suojaa patogeneilta ja myrkyllisiltä ainesosilta
- ruuansulatuksen tasapainottaminen parantumisvaiheessa
- voidaan käyttää juomarehun seassa
- erinomainen sulavuus

Sinun etusi

- turvallinen ja nopea vaikutus
- nopea toipuminen
- helppo käyttö ja annostelu, säästää aikaa
- vähemmän eläinlääkärinkuluja



Käyttö

ternivaihe	juottovaihe	kasvatusvaihe	nuorkarjan kasvatus
●	●		

Curavit

Erityisrehu vasikoille/ Specialfoder för kalvar



Curavit

Tärkeimmät ravitsemukselliset ominaisuudet:/ Det viktigaste inslaget i närings:

elektrolyyttejä, helposti imeytyvät hiilihydraatit
elektrolyt, lätt absorberas kolhydrater

Ravintoaineet:/ Analytiska beståndsdelar:

4,0 %	raakavalkuainen/ råprotein	17,8 %	tuhka/ råaska
1,0 %	raakarasva/ råfett	5,4 %	natrium/ natrium
7,0 %	raakakuitu/ växtråd	1,7 %	kalium/ kalium
		5,1 %	kloridi/ klorid

Ravintoainekostumus:/ Tillvärningsämnen:

Hedelmäpuriste (omena, sitrushedelmä) / fruktpress (äpple, citrusfrukter)
glukoosi/ glukos
johanneksennleipäpuu jauhe/
johannesbrödträd pulver
maltodextriini/ maltodextrin
natriumkloridi/ natriumklorid
psylliumjauhe/ psylliumpulver
perunatärkkelys/
potatisstärkelse
natriumbikarbonaatti/
natriumbikarbonat (4,3%)
sikurijauhe / cikoria pulver
kaliumkloridi/ kaliumklorid
magnesiumoksidi/
magnesiumoxid



Pääasialliset hiilihydraattilähteet: / Den huvudsakliga kolhydratkällan:

Hedelmäpuriste (omena, sitrushedelmä) / fruktpress (äpple, citrusfrukter), glukoosi/ glukos, johanneksennleipäpuujauhe/
johannesbrödträd pulver, maltodextriini/ maltodextrin,
psylliumjauhe/ psylliumpulver, perunatärkkelys/
potatisstärkelse, sikurijauhe / cikoria pulver

Huomaa / Observera::

Riskitilanteissa, kun ruuansulatusongelmia esiintyy (ripuli) on suositeltavaa kysyä neuvoa asiantuntijalta (eläinlääkäri) ennen käyttöä ja käyttöaikaa pidennettäessä. / Vid riskfall när fodermålningsproblem (diarré) inträffas rekommenderas det är att fråga experten (veterinär) innan man använder produkten eller när användningstid blir längre.

Curavit

käytetään ripulin hillitsemiseen vasikoilla.
Används för att bromsa kalvdiarré.

Käyttösuositus:/ Användningsrekommendation:

Curavit sekoitetaan maitoon tai juomarehuun. Curavit voidaan sekoittaa myös veteen. Suositeltu juoman lämpötila on 38°C. Curavit blandas i mjölken eller mjölkersättning. Curavit kan blandas i vatten. Rekommenderad dryck temperatur är 38°C.

Ennaltaehkäisyyn ja toipumisvaiheessa:

1 g Curavit per kg elopainokilo (LW) päivässä.
50 elopainokiloa = 50 g Curavit = noin 1 mittakupillinen *
100 elopainokiloa = 100 g Curavit = noin 2 mittakupillista**
Käytetään enintään kolmen päivän ajan.
* jos halutaan annostella kahdesti päivässä annetaan 1/2 mittakupillista ruokintakerralla.
** jos halutaan annostella kahdesti päivässä annetaan 1 mittakupillinen ruokintakerralla.

Förebyggande och återhämtningstid:

1 g Curavit per kg levande vikt (LW) per dag.
50 levande vikt = 50 g Curavit = cirka 1 måttsked *
100 levande vikt = 100 g Curavit = cirka 2 måttskeds**
Används i högst tre dagar.
* om du vill dosera två gånger om dagen ge 1/2 måttsked utfodring tid.
** om du vill dosera två gånger om dagen ge 1 måttskedd utfodrings tid.

Ripuli tapauksissa:

2 g Curavit per kg elopainokilo (LW) päivässä.
50 elopainokiloa = 100 g Curavit = noin 2 mittakupillista***
100 elopainokiloa = 200 g Curavit = noin 4 mittakupillista ****
Käytetään enintään viiden päivän ajan.
*** jos halutaan annostella kahdesti päivässä annetaan 1 mittakupillinen ruokintakerralla.
**** jos halutaan annostella kahdesti päivässä annetaan 2 mittakupillista ruokintakerralla.

Diarréfall:

2 g Curavit per kg levande vikt (LW) per dag.
50 levande vikt = 100 g Curavit = cirka 2 måttskeds***
100 levande vikt = 200 g Curavit = cirka 4 måttskeds****
Används i högst fem dagar.
*** om du vill dosera två gånger om dagen ge 1 måttsked utfodring tid.
**** om du vill dosera två gånger om dagen ge 2 måttskeds utfodring tid.